



バイロハスアグリ畜産用W



バイロハスアグリ露地用

## 薬剤の急性経口毒性比較

物質	急性経口毒性 LD50 (mg/kg)
青酸カリ	ラット10mg/kg
DDVP	ラット53mg/kg
硫酸ニコチン	ラット83mg/kg
カフェイン	ラット200mg/kg
ベルメトリン	ラット650mg/kg
食塩	ラット3,000mg/kg
バイロハスアグリ/ 畜産用W	ラット12,000mg/kg

\*シンガポール国立大学薬理学部調べ

ている。  
ワクモ・トリサシダニ・ウジ対策としてはバイロハスアグリ「畜産用W」を五〇〇倍希釈したものを直接散布。飼養環境衛生の維持にはバイロハスアグリ「露地用」を一〇〇〜二〇〇倍の希釈液を二〜四週間に一

回散布することによって抜群の抗菌・消臭効果が得られる。

バイロハスアグリ「畜産用W」(リットル)、バイロハスアグリ「露地用」(リットル)ともに希望小売価格は一万八〇円。

本製品に関する問い合わせは日本エコロジア(東京都渋谷区恵比寿西一―一六―一六エースビル四階、TEL〇三―三七八〇―四〇七〇、[info@ecologia.co.jp](mailto:info@ecologia.co.jp))まで。

## ポジティブリスト制度完全対応の殺虫剤 バイロハスアグリ「畜産用W」「露地用」

日本エコロジア

日本エコロジア(株)(東京都渋谷区、西嶋康祐社長)は殺虫効果が高く、人体・家畜に対する影響の少ない殺虫剤バイロハスアグリ「畜産用W」、バイロハスアグリ「露地用」を販売している。本製品はニームオイルを中心とした天然植物油と食品添加物のみで構成されているため、鶏に直接散布が可能。天然成分を中心に構成されているため、虫が耐性をつけ

にくく、ポジティブリスト制度残留基準の対象外となった成分で構成されているため、どれだけ使用しても残留基準の対象になることがない。シンガポール農業食料家畜局中央研究所における調査結果によると、ニューカッスル病ウイルス、オースキー病ウイルス、豚コレラウイルス、伝染性気管支炎ウイルスについて九九・九%以上の除去が確認され